



Утверждаю:

Директор ООО «Белэкотехника»

С.В. Фокин

« 3 » сентября 2012 года

Инструкция по применению добавки кормовой подкисляющей Стабифор

1 Общие сведения

1.1 **Стабифор** (далее кормовая добавка) представляет собой жидкость синего или сине-зеленого цвета.

1.2 В 100 см³ добавки содержится:

Показатели	Единица измерения	Количество
Муравьиная кислота	г	40,00
Уксусная кислота	г	10,00
Формиат аммония	г	20,00
Меди сульфат	г	2,00
Наполнитель до 1 литра		

1.3 Кормовую добавку фасуют в полимерную тару по 500 и 1000 см³, полимерные канистры по 5, 10, 20, 25, 30, 40 дм³.

1.4 Кормовую добавку хранят в упаковке предприятия-изготовителя, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0⁰С до плюс 35⁰С.

1.5 Срок годности два года от даты изготовления, при соблюдении условий хранения.

2 Порядок применения

2.1 Стабифор применяют в животноводстве для подкисления воды, ускорения ферментации и улучшения усвояемости корма, повышения продуктивности и ускорения роста у птиц, поросят, телят, а также для дезинфекции систем водоснабжения, трубопроводов, резервуаров.

2.2 Кормовую добавку применяют в следующих дозах:

- для повышения продуктивности и ускорения роста у молодняка сельскохозяйственных животных и птиц – 2,0 л добавки растворяют в 1000 л питьевой воды. Применение добавки проводится ежедневно или через сутки в зависимости от эпизоотического состояния в хозяйстве;

- для проведения дезинфекции систем водоснабжения (во время санации птичников, свинарников) 10 л добавки растворяют в 1000 л воды, прокачивают по системе водоснабжения и выдерживается в течении 24 ч.

2.3 Запрещается использовать добавку совместно с вакцинами и другими биологически активными веществами, применяемыми с питьевой водой.

2.4 В рекомендуемых дозах кормовая добавка не оказывает побочных явлений. В случае выявления непереносимости кормовой добавки её не применяют.

2.5 Добавка не обладает коррозионными свойствами на системы водоснабжения, поилки, элементы конструкции.

2.6 Продукция животноводства, полученная от животных обработанных кормовой добавкой, используется без ограничений.

3 Меры личной профилактики

3.1 При работе с кормовой добавкой следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

3.2 После окончания работы с добавкой руки и лицо следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

3.3 При попадании добавки на кожу - промыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть большим количеством воды.

4 Порядок предъявления рекламаций

4.1 В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки, её использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

5 Полное наименование производителя

5.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника».