

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ
27.03.2018

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению мази Левомеколь
(Unguentum Laevomecolum)

(Организация-разработчик ООО «Ветторг»,
143180, Московская обл., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2)

Номер регистрационного удостоверения 32-3-8.15-2821№ПВР-3-1.9/00345

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: мазь Левомеколь (Unguentum Laevomecolum)
Международное непатентованное наименование: левомицетин (хлорамфеникол), метилурацил.
2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.
Мазь Левомеколь содержит в 100 г в качестве действующих веществ левомицетина (хлорамфеникола) - 0,75 г и метилурацила - 4,0 г, а в качестве вспомогательных веществ полиэтиленоксид 400 и полиэтиленоксид 1500.
3. Мазь Левомеколь по внешнему виду представляет собой однородную массу белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Срок годности (в том числе после первого вскрытия) при соблюдении условий хранения в плотно укупоренной таре производителя – 3,5 года. Запрещается использовать мазь Левомеколь по истечении срока годности.
4. Выпускают мазь Левомеколь расфасованной по 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 570, 600, 650, 700, 750, 800, 870, 900 г и 1000 г в полимерных или стеклянных банках соответствующей вместимости, укупоренных крышками, или по 7, 10, 15, 18, 20, 23, 25, 30, 34, 40, 78, 80, 140, 162 г и 200 г в тубах полимерных или алюминиевых с внутренним лаковым покрытием соответствующей вместимости. В групповую упаковку вкладывают потребительские упаковки, укомплектованные инструкциями по применению.
5. Мазь Левомеколь хранят в упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Мазь Левомеколь следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. Запрещается использовать первичную упаковку из-под мази Левомеколь для бытовых целей, она подлежит утилизации как бытовой отход.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Мазь Левомеколь относится к антибактериальным препаратам для наружного применения.

10. Мазь Левомеколь оказывает комплексное противовоспалительное, антимикробное и регенерирующее действие. Входящий в состав мази левомицетин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa* и *Escherichia coli*. Метилурацил стимулирует обменные процессы в клетках, процесс заживления ран, восстановление тканей, оказывает противовоспалительное действие. Метилурацил повышает местный иммунитет за счет усиления выработки лейкоцитов и интерферона. Мазевая основа полиэтиленоксид способствует глубокому проникновению компонентов мази в глубь тканей, без повреждения биологических мембран. Это позволяет сохранять антибактериальную активность в присутствии гноя.

Мазь Левомеколь по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Мазь Левомеколь назначают для обработки гнойных ран, инфицированных смешанной микрофлорой (включая стафилококки, синегнойную и кишечную палочки).

12. Противопоказанием к применению мази Левомеколя является повышенная индивидуальная чувствительность к левомицетину и метилурацилу.

13. При работе с мазью Левомеколь следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании обработки руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с повышенной чувствительностью к левомицетину следует избегать прямого контакта с мазью Левомеколь.

При попадании мази Левомеколь на слизистую оболочку глаз, следует немедленно снять ее тампоном и промыть глаза большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Мазь Левомеколь разрешается применять беременным животным, лактирующим и молодняку.

15. Мазь Левомеколь применяют местно. Мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, затем накладывают на пораженную поверхность кожи и закрепляют повязкой. В гнойные полости мазь Левомеколь вводят через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. Для такого использования мазь предварительно подогревают до 35-40 °С. Перевязки делают ежедневно до полного очищения пораженной кожи. При инфекционных воспалениях кожи и слизистых оболочек мазь Левомеколь после очищения пораженного участка наносят тонким ровным слоем 1-2 раза в день до выздоровления, как отдельно, так и в качестве комплексного лечения.

16. Мазь Левомеколь не вызывает у животных побочных явлений и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией. Крайне редко у гиперчувствительных к левомицетину животных возможны аллергические реакции в виде кожных высыпаний. В случае появления аллергической реакции использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Мазь Левомеколь не рекомендуется применять одновременно с другими антибактериальными препаратами для местного применения. Использование мази не исключает применения других лекарственных препаратов.

19. Особенности действия мази Левомеколь при первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки мазью Левомеколь следует возобновить обработку в той же дозе по той же схеме.

21. Мазь Левомеколь не предназначена для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «Ветторг»,
143180, Московская обл., г. Звенигород,
Нахабинское шоссе, д. 2
тел.: (905) 710-00-10, (925) 771-21-68

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «Ветторг»,
105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 28
тел.: (495) 632-18-04

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению мази Левомеколь, утвержденная Россельхознадзором 19 октября 2015 г.