

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мастieta Голд для лечения
маститa у коров в период лактации

(организация-разработчик: «Интервет Интернешнл Б.В.»,
Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксмеер, Нидерланды/
Intervet International B.V., Wim de K rverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer,
The Netherlands).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мастьет Голд (Mastijet® Gold).

Международное непатентованное название: цефaпирин и преднизолон.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

В одном шприце-дозаторе Мастьет Голд содержится в качестве действующих веществ: 300 мг цефaпирина (в форме натриевой соли) и 20 мг преднизолона, а в качестве вспомогательных веществ: глицерол моностеарат, алюмосиликат кальция и натрия, арахисовое масло.

3. По внешнему виду Мастьет Голд представляет собой суспензию бело-желтого цвета.

Срок годности Мастьет Голд при соблюдении условий хранения 36 месяцев с даты производства. После вскрытия содержимое шприца-дозатора необходимо сразу использовать.

Запрещается использовать Мастьет Голд по истечении срока годности.

4. Мастьет Голд выпускают расфасованным по 8 г в стерильных пластиковых шприцах-дозаторах для интрацистернального введения, наконечники которых укупорены пластиковыми колпачками. Шприцы-дозаторы упаковывают по 20 штук в картонные коробки вместе с соответствующим количеством очищающих салфеток. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению.

5. Мастьет Голд хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от 2°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в

соответствии с требованиями законодательства.

8. Мастьет Голд отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мастьет Голд относится к комбинированным антибактериальным препаратам для интрацистернального введения.

10. Цефепим, входящий в состав Мастьет Голд, относится к группе беталактамов, обладает бактерицидным действием в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий - основных возбудителей мастита коров, в том числе *E.coli*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella spp*, *Arcanobacterium pyogenes*, коагулазонегативных стафилококков, *Streptococcus dysagalactiae*, *Streptococcus agalactiae*.

Механизм действия цефепима в бактериальной клетке заключается в блокировании ферментов транспептидаз, связывающих пептидогликан клеточной стенки, в результате чего бактериальная клетка разрушается.

Преднизолон - глюкокортикостероид, обладая противовоспалительным и противоаллергическим действием, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени.

При интрацистернальном введении цефепим и преднизолон быстро проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 12 часов; в кровь поступают в незначительной степени, выводятся из организма преимущественно с молоком и незначительно с мочой.

По степени воздействия на организм Мастьет Голд относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не оказывает раздражающего действия на паренхиму вымени.

III. Порядок применения

11. Мастьет Голд предназначен для лечения клинических и субклинических форм мастита у коров в период лактации.

12. Запрещается использовать Мастьет Голд в сухостойный период и животным с гиперчувствительностью к беталактамным антибиотикам. Не следует применять очищающие салфетки для обработки сосков с открытыми ранами.

13. Мастьет Голд вводят в пораженную четверть вымени коровы в разовой дозе 8 г (содержимое 1 шприца-дозатора) 2-4кратно с интервалом 12 часов.

Перед введением препарата из пораженной четверти вымени полностью выдаивают молоко (секрет), обеззараживают и утилизируют его;

- тщательно дезинфицируют кончик соска прилагаемой очищающей салфеткой;

- удаляют верхушку защитного колпачка с наконечника шприца-дозатора, вводят наконечник в молочный канал (на 5 мм) или удаляют колпачок полностью и вводят наконечник в сосковый канал на всю его длину. Предпочтительным способом является частичное введение, при невозможности

его выполнения наконечник шприца-дозатора вводят на всю его длину, при этом эффективность лечения не снижается.

- содержимое шприца-дозатора (1 доза) осторожно выдавливают в пораженную четверть вымени;

- извлекают шприц-дозатор, пережимают верхушку соска и массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата.

14. Симптомов передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом введении или при его отмене не выявлено.

16. Мастиет Голд разрешено использовать стельным и лактирующим животным.

17. Следует избегать пропусков введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозировке и схеме применения.

18. При применении Мастиет Голд в соответствии с инструкцией по применению побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

19. Применение Мастиет Голд не исключает использование других лекарственных средств, за исключением препаратов для интрацистернального введения.

20. Молоко в пищевых целях может быть использовано не ранее, чем через 132 часа (11 доек) после последнего введения Мастиет Голд. Молоко из здоровых четвертей вымени, полученное ранее установленного срока, можно использовать после термической обработки в корм животных. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 96 часов (4 суток) после последнего применения лекарственного препарата. В случае вынужденного убоя ранее указанного срока, мясо животных можно использовать для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Мастиет Голд следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы с лекарственным препаратом следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к пенициллинам и цефалоспорином следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом.

23. При попадании лекарственного препарата в глаза или на слизистые оболочки следует немедленно промыть их чистой водой, при необходимости следует обратиться к врачу. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании Мاستиет Голд в организм человека следует обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование производственной производителя препарата для применения.	и площадки лекарственного ветеринарного	адрес «Интервет Интернешнл Б.В.» (Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды) / Intervet International B.V. (Wim de Kórverstraat 35, P.O. Box 31 5830 АА Boxmeer, The Netherlands).
---	--	--

Наименование, уполномоченной владелец удостоверения препарата на потребителя.	адрес организации, держателем или регистратора лекарственного препарата на принятие претензий от	ООО «Интервет» (Россия, 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ул. Промышленная, дом 81/1).
--	---	--

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Мاستиет Голд, утвержденная Россельхознадзором 11.07.2011 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 528-3-12.15-231711/31-3-5.003208