

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
протокол от «12» сентября 2019 г. № 103

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного препарата
«Йодозоль»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Йодозоль (Iodozolum).

1.2 Лекарственная форма: раствор для внутриматочного введения в аэрозольной упаковке.

1.3 По внешнему виду препарат представляет собой пенящуюся жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета.

1.4 В 1,0 мл препарата содержится 0,01 г калия йодида, 0,004 г йода, вспомогательные вещества (натрия лауретсульфат, диметилсульфоксид), вода очищенная, препеллент.

1.5 Препарат выпускают в алюминиевых баллонах с аэрозольным клапаном номинальным объемом 40,0 мл.

1.6 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до плюс 30 °С. Баллон под давлением. Беречь от удара и нагрева выше плюс 40 °С. Срок годности препарата – 1 год от даты производства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Не использовать после истечения срока годности.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Йод обладает бактериостатическим и бактерицидным действием в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Streptococcus aureus*, *Clostridium septicum*, *Aspergillus flavus*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*.

2.2 В основе механизма действия йода лежит способность нарушать обменные процессы в микробной клетке. Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с аминоклассами белков, подавляет жизненно важные ферментные системы.

Калия йодид, входящий в состав препарата, стабилизирует раствор, препятствуя превращению свободного йода в йодистый водород и йодистый этил.

2.3 Объем пены, образующейся после введения препарата, позволяет достичь максимального контакта действующего вещества с эндометрием. Из организма йод выводится преимущественно с мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют коровам, кобылам, свиноматкам, овцематкам для лечения при остром и хроническом эндометрите, а также с профилактической целью после оперативного отделения последа.

3.2 Препарат вводят внутриматочно после обработки наружных половых органов и корня хвоста антисептическими препаратами. Содержимое одного баллона соответствует одной дозе. Обработку проводят однократно. В тяжелых случаях возможно повторное применение препарата через семь дней.

При пиометре перед введением препарата предварительно удаляют содержимое матки.

При необходимости рекомендуется вводить препараты, усиливающие сократительную активность миометрия.

При необходимости перед применением баллон с препаратом согревают до температуры около 30 °С.

3.3 Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к препаратам йода.

3.4 При возникновении аллергических реакций (учащение пульса, повышение температуры тела, зуд) препарат следует отменить, назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.5 Мясо и молоко животных в пищевых целях используются без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.




5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белветфарма» (247050, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, ул. Фрунзе, 17. Тел./факс: 8 (02333) 5-38-56, 8 (0232) 26-36-29) по заказу Общества с ограниченной ответственностью «ГомельФарм» (246048, Республика Беларусь, г. Гомель, проезд Орудийный, 192, комн. 5. Тел./факс: 8 (0232) 26-36-29).

Инструкция по применению препарата разработана сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Петров В.В., Ятусевич Д.С. и Баркалова Н.В.).

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
«14» 09 2019 г.	протокол № 103