

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мази стрептоцидовой 10 %
для лечения заболеваний кожи у животных

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс»,
610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь стрептоцидовая 10 % (Unguentum Streptocidi 10 %).

Международное непатентованное наименование: сульфаниламид (стрептоцид).

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь стрептоцидовая 10 % в 100 г в качестве действующего вещества содержит сульфаниламид (стрептоцид) - 10 г, в качестве вспомогательного вещества вазелин - 90 г.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой густую однородную массу от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности Мази стрептоцидовой 10 % в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения - 5 лет с даты производства. Запрещается применять Мазь стрептоцидовую 10 % после окончания срока годности.

4. Выпускают Мазь стрептоцидовую 10 % расфасованной по 30, 70, 100, 150, 200 г в полимерные тубы или по 70, 100, 200, 800 г в полимерные банки соответствующей вместимости, которые закрывают крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую единицу фасовки сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

6. Мазь стрептоцидовую 10 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача

II. Фармакологические свойства

9. Мазь стрептоцидовая 10% относится к антибактериальным препаратам для наружного применения.

10. Действующее вещество препарата сульфаниламид (стрептоцид) обладает широким спектром противомикробного действия, способствует уменьшению секреции и экссудации, ускорению процессов регенерации поврежденной ткани.

По степени воздействия на организм Мазь стрептоцидовая 10 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Мазь стрептоцидовую 10 % применяют животным для лечения заболеваний кожи (ран, язв, ожогов и других хирургических патологий).

12. Противопоказанием к применению Мази стрептоцидовой 10 % является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. Мазь стрептоцидовую 10 % применяют животным наружно, нанося тонким слоем на поврежденную поверхность кожи или намазывают на стерильную марлевую салфетку и прикладывают к ране 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от тяжести поражения. При необходимости предварительно проводят туалет раны. Для предотвращения слизывания мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Противопоказания и особенности применения препарата беременным и лактирующим животным, а также возрастные ограничения отсутствуют.

17. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок, препарат следует нанести как можно быстрее, далее интервал между обработками не меняется.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Мази стрептоцидовой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение мази прекращают, мазь удаляют марлевым тампоном с поверхности кожи, при необходимости назначают антигистаминные препараты.

19. Мазь стрептоцидовую 10 % не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

20. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью стрептоцидовой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Мазью стрептоцидовой 10 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. При работе с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к Мази стрептоцидовой 10 % следует избегать прямого контакта с препаратом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать в бытовых целях, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази стрептоцидовой 10 %, утвержденная Россельхознадзором 12 февраля 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения

24-3-9,17-3826 НТФР-3-1,9/00162