

**Инструкция по применению
вакцины поливалентной против
лептоспироза свиней серогрупп Помона, Тарассови, Иктерогеморрагия**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Вакцина поливалентная против лептоспироза свиней серогрупп Помона, Тарассови, Иктерогеморрагия.
- 1.2 Вакцину изготавливают из инактивированных штаммов лептоспир серогрупп Помона, Тарассови, Иктерогеморрагия, выращенных на сывороточной среде.
- 1.3 По внешнему виду вакцина представляет собой жидкость с серо-белым осадком, который при встряхивании легко разбивается в гомогенную взвесь.
- 1.4 Вакцину упаковывают в стерильные стеклянные флаконы по 50, 100, 200 см³. Флаконы с вакциной плотно закрывают резиновыми пробками и обкатывают металлическими колпачками.
- 1.5 Хранят вакцину в упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 °С до плюс 15 °С.
- 1.6 Срок годности вакцины 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 В вакцине содержатся инактивированные микробные тела вакцинных штаммов лептоспир общей концентрацией не менее 75 млн в 1,0 см³. Антигенные комплексы вызывают выработку специфических антител, которые обеспечивают иммунитет против возбудителей лептоспироза.
- 2.2 Вакцина безвредная и ареактогенная.
- 2.3 Иммунитет у животных наступает через 14-20 суток после введения вакцины и сохраняется не менее 6 месяцев.
- 2.4 Вакцина не обладает лечебными свойствами.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Вакцину применяют в хозяйствах, неблагополучных и угрожаемых по заболеванию лептоспирозом, при выявлении в хозяйстве животных, сыворотка крови которых реагирует на лептоспироз в РМА или РА.
- 3.2 Вакцинации не подлежат животные в последний месяц супоросности и в первую неделю после опороса, а также в течение 7 суток после дегельминтизации. По истечении указанных сроков животных вакцинируют.
- 3.3 Перед применением и в процессе применения флаконы с вакциной необходимо встряхивать до образования однородной взвеси, подогревать на водяной бане до температуры (36-37) °С.
- 3.4 При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики. Перед применением вакцины шприцы, иглы стерилизуют кипячением и для каждого животного используют отдельную иглу, кожу на месте введения вакцины обрабатывают антисептическим средством, разрешенным к применению.
- 3.5 Свиней вакцинируют в возрасте одного месяца и старше, вакцину вводят внутримышечно однократно (за исключением поросят в возрасте от 1 до 3 месяцев, которых вакцинируют двукратно) в дозах, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Вид и возраст животных	Дозы вакцины (см ³)		Срок ревакцинации (месяцы)
	первичная вакцинация	ревакцинации	
Свиньи: 1-3 месяца	2+3 (с интервалом 12-15 дней)	6	6
от 3 до 10 мес	6	6	6
хряки и свиноматки	10	8	6

3.6 Вакцину используют в день вскрытия флакона. Неиспользованная вакцина специального обезвреживания не требует, не представляет опасности для животных, человека и окружающей среды.

3.7 Убой животных на мясо после применения вакцины разрешается без ограничений.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с вакциной следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения вакцины, ее использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению вакцины в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19^а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ОАО «БелВитунифарм»
211309, д. Должа, ул. Советская д. 26А, Витебский р-н и обл., Республика Беларусь.

Инструкция по применению Вакцины поливалентной против лептоспироза животных разработана специалистами ОАО «БелВитунифарм» (Шашкова Ю.А., Коновалова И.И.).

