

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Креолина бесфенольного каменноугольного для лечения и профилактики псороптоза овец и коз, профилактики копытной гнили овец, коз и некробактериоза крупного рогатого скота.

(Организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты», Владимирская область., г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие положения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Креолин бесфенольный каменноугольный (*Creolinum anphenolicum carbonicum*)

Международное непатентованное название: масло каменноугольное

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения

Креолин бесфенольный каменноугольный содержит в качестве действующего вещества: нафталин - 11,5 % (по маслу каменноугольному), а в качестве вспомогательных веществ: канифоль - 20 %, натрий-ихтиол - 6 %, неонол - 3% и воду до 100%. По внешнему виду представляет собой однородную маслообразную жидкость, прозрачную в тонком слое, с запахом каменноугольного масла, от темно-коричневого до черно-бурого цвета. С водой образует стойкую эмульсию молочно-белого или молочно-серого цвета.

Креолин бесфенольный каменноугольный выпускают расфасованным в стеклянных бутылках, флаконах и банках или в полимерных бутылках, флаконах с полиэтиленовыми пробками; в канистрах стальных или полимерных; в бочках металлических или полимерных с навинчивающимися пробками с контролем первого вскрытия.

3. Срок годности Креолина бесфенольного каменноугольного при соблюдении условий хранения – 2 года со дня выпуска. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

4. Креолин бесфенольный каменноугольный хранят в закрытой упаковке организации-производителя в складских условиях, отдельно от продуктов питания и кормов, недоступном для посторонних лиц и животных месте, при температуре от минус 25⁰С до 40⁰С.

5. Креолин бесфенольный каменноугольный следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Креолин бесфенольный каменноугольный с истекшим сроком годности обезвреживают 5% раствором едкой щелочи или хлорной извести (суспензия в воде 1:3). Загрязненную лекарственным препаратом тару обезвреживают заполнением на 5-6 часов 3-5% раствором кальцинированной соды, после чего промывают водой. Обезвреженные остатки Креолина бесфенольного каменноугольного и смывные воды после обработки тары и спецодежды собираются в бетонированный резервуар и обрабатываются хлорной известью (500 г на 10 л стоков).

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний кожи

Креолин бесфенольный каменноугольный оказывает акарицидный эффект на возбудителей псороптоза овец (коз), обладает продолжительным остаточным действием на кожно-волосном покрове. Также он обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителя некробактериоза крупного рогатого скота – *Fusebacterium necroforum* и копытной гнили овец – *Dichelobacter nodosius*), грибов рода кандиды.

Креолин бесфенольный каменноугольный по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Креолин бесфенольный каменноугольный применяют:

- с лечебной и профилактической целью при псороптозе овец и коз;
- для профилактики копытной гнили у овец, коз и некробактериоза крупного рогатого скота.

9. Противопоказанием к применению Креолина бесфенольного каменноугольного служит повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата.

10. При псороптозе овец и коз в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 20°C животных купают в пропływной ванне (или специально приспособленной емкости) в 2%-й водной эмульсии Креолина с одномоментным погружением головы в купочный раствор. Температура купочной эмульсии должна быть не ниже 20°C. Экспозиция – 2 минуты. В холодное время года животных купают в отапливаемых помещениях.

С лечебной целью животных купают дважды с интервалом 10 дней, с профилактической – однократно.

Перед обработкой животным предоставляют отдых, кормление прекращают за 4-5 часов до обработки.

Рабочую эмульсию Креолина бесфенольного каменноугольного готовят перед использованием. С этой целью в наполненную водой ванну при тщательном перемешивании добавляют Креолин бесфенольный каменноугольный из расчета 2 кг на 100 л воды (20 кг на 1000 л).

Дозаправку ванны проводят после обработки 200 овец, добавляя на внесенное дополнительное количество воды 2% лекарственного средства.

При выходе из ванны животных выдерживают в течение 15 минут на выходной площадке для стекания эмульсии, а затем выпускают на пастбище. В холодное время года животных содержат для высыхания в помещении.

При загрязнении ванны, ее освобождают от эмульсии Креолина бесфенольного каменноугольного, тщательно очищают от грязи и вновь заполняют рабочей эмульсией. Отработанную жидкость сливают в бетонный резервуар, не допуская загрязнения среды.

Перед массовыми обработками животных каждую партию Креолина бесфенольного каменноугольного испытывают на небольшой группе животных (10 – 15 голов) различной упитанности. Если у животных в течение 2-х суток после обработки не отмечены признаки токсикоза, приступают к обработке всего поголовья.

Не разрешается обработка дойных и беременных животных, а также подсосных маток. Обрабатывать в пропływной ванне ягнят и козлят после отъема вместе со взрослыми животными не рекомендуется. Запрещается обработка больных инфекционными болезнями, ослабленных и истощенных животных.

Для профилактики копытной гнили овец, коз и некробактериоза КРС рекомендуется всё поголовье клинически здоровых овец, коз и крупного рогатого скота прогонять через дезинфицирующие ванны с 3 %-ной водной эмульсией Креолина бесфенольного каменноугольного (3 кг на 100 л водопроводной воды) двукратно с интервалом 10-15 дней. Экспозиция в рабочем растворе 2-3 мин. Заполняют ванны раствором таким образом, чтобы обеспечить полное погружение копыт животных по путовый сустав (глубиной не менее 15см). Ванны располагают вне животноводческих помещений (в летнее время) или внутри (в зимнее время).

Для достижения более высокого терапевтического эффекта в неблагополучных по копытной гнили и некробактериозу крупного рогатого скота хозяйствах Креолин бесфенольный каменноугольный применяют в комплексе с вакцинацией и другими лечебно-профилактическими и ветеринарно-санитарными мероприятиями.

Профилактическую обработку поверхностей производственных и вспомогательных животноводческих помещений с находящимся в них технологическим оборудованием, шедов для содержания пушных зверей, складских помещений, кормокухонь, залов для прививки и съемки шкур, автомобилей, железнодорожных вагонов (товарные, изометрические) и других видов транспортных средств, используемых для перевозки животных, с преобладанием металлических поверхностей, проводят 3% раствором Креолина бесфенольного каменноугольного при расходе 0,5л/м² и экспозиции 3 часа.

Вынужденную обработку вышеупомянутых объектов против заболеваний, вызванных бактериями группы кишечной палочки и стафилококков, проводят 3,5% раствором Креолина бесфенольного каменноугольного при расходе 0,5 л/м² и экспозиции 3 часа.

Обработку проводят путем орошения поверхностей помещений и элементов технологического оборудования в отсутствие животных, продуктов убоя и готовой продукции с использованием установок типа ДУК-1, ДУК-2, АД-1, УДП-М, ЛСД-3М, ЛСД-ЭП и других.

Органические загрязнения снижают биологическую активность препарата, поэтому перед обработкой необходимо проводить тщательную механическую очистку и мойку обеззараживаемых объектов.

По истечении установленной экспозиции обеззараженные кормушки, поилки, шеды и другие доступные для животных участки поверхностей, места непосредственного контакта с сырьем, животными, готовыми продуктами, места возможного скопления остатков Креолина бесфенольного каменноугольного промывают водой. Животных вводят в помещение после проветривания (открывают окна, двери, люки, включают вентиляцию) и полного исчезновения запаха Креолина бесфенольного каменноугольного.

11. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлены.

12. При пропуске одной или нескольких обработок Креолином бесфенольным каменноугольным применение его следует продолжить согласно инструкции.

13. Креолин бесфенольный каменноугольный не вызывает побочного действия и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

При повышенной чувствительности животного к компонентам препарата возможны индивидуальные реакции (покраснение кожи, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

14. Не рекомендуется применять Креолин бесфенольный каменноугольный с другими средствами из-за возможности их взаимной инактивации.

15. Убой животных разрешается через 24 часа после обработки. При вынужденном убое ранее установленного срока мясо используют на корм плотоядным или для изготовления мясо-костной муки.

IV. Меры лично профилактики

16. При работе с Креолином бесфенольным каменноугольным следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

17. Во время работы с Креолином бесфенольным каменноугольным запрещается пить, курить, принимать пищу. Обслуживающий персонал не допускается в помещение в период аэрозольных обработок. По окончании работы сапоги и перчатки, а также использованную тару и дезустановку промыть водой, лицо и руки вымыть теплой водой с мылом.

18. При попадании Креолина бесфенольного каменноугольного на кожу людей, его необходимо смыть обильным количеством воды с мылом. При попадании Креолина бесфенольного каменноугольного на слизистые оболочки и в глаза необходимо их обильно промыть водой, затем 2%-ным раствором пищевой соды. При необходимости обратиться к врачу.

При случайном попадании Креолина бесфенольного каменноугольного в желудок дать пострадавшему несколько стаканов теплой воды с 10-15 измельченными таблетками активированного угля или другого адсорбента, а затем солевое слабительное. После этого необходимо обратиться в лечебное учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование пустой тары из-под Креолина бесфенольного каменноугольного для пищевых и бытовых целей.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, 2.

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Креолина бесфенольного каменноугольного, утвержденная Россельхознадзором 3 апреля 2006 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационное удостоверение выдано ОАО завод «Ветеринарные препараты»

Номер регистрационного удостоверения: