

практически всех известных микроорганизмов, вызывающих маститы (*E. coli*, *Strept. uberis*, *Staph. aureus*, *Strept. agalac.*, *Strept. disagalac.*, *Klebs. spp.*, *Arcanobact. ruog.*)

Механизм действия входящих в состав препарата окситетрациклина и неомицина заключается в ингибировании синтеза белков в бактериальной клетке.

Бацитрацин, проникая в бактериальную клетку, связывается с рецепторами на ее внутренней поверхности и нарушает синтез пептидогликана.

Преднизолон – глюкокортикостероид, обладая противовоспалительным и противоаллергенным действием, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени. При введении лекарственного препарата в молочную цистерну действующие вещества проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 12 часов.

III. Порядок применения

11. Мастинон Форте применяют для лечения клинических и субклинических форм мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации. Показан собакам и кошкам для лечения отитов и кожных инфекций.

12. Противопоказанием для применения Мастинон Форте является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

13. Мастинон Форте вводят в пораженную четверть вымени коровы в разовой дозе 8 г (содержимое 1 шприца-катетера) 3-4-кратно с интервалом 12 часов.

Перед применением препарата молоко (секрет) из больных четвертей вымени сдаивают, обеззараживают и утилизируют, вымя и соски тщательно моют теплой водой и насухо вытирают. Затем снимают защитный колпачок, вводят наконечник шприца-катетера в канал соска и осторожно выдавливают содержимое. После этого наконечник извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата.

Для лечения отитов у собак и кошек:

Очистить воспаленный участок антисептиком, просушить ватным тампоном или дать высохнуть самостоятельно. Затем снять колпачок с наконечника шприца, ввести наконечник в ушную раковину и выдавить необходимое количество содержимого. Извлечь шприц из слухового прохода и помассировать основание ушной раковины. Обработки проводить 2 раза в день до исчезновения клинических признаков.

Для лечения кожных инфекций:

Пораженные участки кожи обрабатывать два раза в день методом наложения аппликаций.

Для лечения баланопоститов:

Ввести содержимое одного шприца в препуциальный мешок и с помощью легкого массажа равномерно распределить препарат.

14. Симптомы передозировки при применении Мастинон Форте не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

16. Не рекомендуется применять Мастинон Форте коровам в сухостойный период.

17. При случайном пропуске введения очередной дозы лекарственного препарата, его следует ввести как можно быстрее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

18. При применении Мастинон Форте в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций (крапивница, диарея, др.) использование лекарственного препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Применение Мастинон Форте не исключает использование других лекарственных средств, за исключением препаратов для интрацистернального введения.

20. Убой животных на мясо разрешен не ранее, чем через 14 суток после последнего введения Мастинон Форте. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Молоко от животных, подвергшихся лечению препаратом, используют в пищу людям не ранее, чем через 96 часов после последнего введения препарата. Молоко из здоровых четвертей вымени, полученное ранее установленного срока, можно использовать после термической обработки для кормления животных.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Мастинон Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мастинон Форте. Запрещается использование пустых шприцев-катетеров для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Наименование и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного назначения

ООО «БиоФармГарант»
600901, г. Владимир,
мк/р-н Юрьевец,
ул. Станционная, д. 45

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «БиоФармГарант»
600901, г. Владимир,
мк/р-н Юрьевец,
ул. Станционная, д. 45

Номер регистрационного удостоверения

____ПК-ВП-4-2887-14____