

Рассмотрено и одобрено
на Ветбиофармсовете
Протокол №89
от 3 марта 2017 г

Инструкция по применению препарата ветеринарного «Ихтиол 100»

1 Общие сведения

- 1.1 Ихтиол 100 (Ichthyolum 100)
- 1.2 Ихтиол 100 представляет собой густую или сиропобразную однородную массу, темно-бурого цвета, с запахом ихтиола.
- 1.3 Состав: ихтиол ветеринарный, содержащий не менее 10,0 % серы.
- 1.4 Препарат выпускают в полимерной таре по 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг; 0,8 кг, 1,0 кг, 5,0 кг
- 1.5 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не ниже 0°C и не выше плюс 25°C.
- 1.6 Срок годности 5 лет со дня изготовления.

2 Фармакологические свойства

- 2.1 Действует антимикробно, противовоспалительно и кератопластически. После нанесения на раны и слизистые оболочки, помимо антимикробного влияния, суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, ускоряет регенерацию пораженной ткани.
- 2.2 При приеме внутрь оказывает антисептическое и противобродильное действие.

3 Порядок применения

- 3.1 Назначают наружно при различных заболеваниях кожи (раны, экземы, ожоги, дерматиты, фурункулез, пиодермии), подкожной клетчатки и мышц, при артритах, невралгиях, тендинитах, тендовагинитах, бурситах, маститах.
- 3.2 В качестве антисептического и противобродильного средства применяют внутрь при острой тимпании рубца, метеоризме, функциональном расстройстве кишечника, воспалении желудка и кишечника, при остром расширении кишок (колики). Дозы внутрь: лошадям 10-30 г; крупному рогатому скоту 10-20 г; мелкому рогатому скоту и свиньям 1-5 г.
- 3.3 В акушерской практике используют методом спринцевания при эндометритах, вагинитах в виде 3-5%-ных растворов, приготовленных на изотоническом растворе натрия хлорида.
- 3.4 Препарат несовместим в растворах с алкалоидами, солями тяжелых металлов, солями йода, аммиака, гликозидов.
- 3.5 После наружного применения препарата животноводческую продукцию используют без ограничений, а после внутреннего – через 2 дня после последнего применения препарата.

4 Меры личной профилактики.

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.
- 4.2 Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

5 Порядок предъявления рекламаций.

- 5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 Полное наименование изготовителя.

6.1 Унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов» ул. 11-я Свердлова, 15, 210001, г.Витебск, Республика Беларусь.

Инструкция подготовлена доцентом кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных имени Я. Г. Губаревича УО «ВГАВМ» А.А. Гарбузовым, доцентом кафедры нормальной и патологической физиологии животных УО «ВГАВМ» Е.А. Юшковским.

