

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Лацилина для лечения послеродовых осложнений у коров

(Организация-разработчик: ООО «РЕПРОВЕТ», 140563, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 252)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Лацилин (Lacylin).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Лацилин в 100 мл содержит в качестве действующих веществ матричные настойки природного происхождения *Pulsatilla vulgaris* (прострел обыкновенный)  $\odot = D3 - 4$  мкл, *Secale cornutum* (спорынья пурпурная)  $\odot = D4 - 4$  мкл, *Licopodium clavatum* (плаун булавовидный)  $\odot = D4 - 4$  мкл, *Lachesis mutus* (яд змеи сурукуку)  $\odot = D10 - 4$  пкл, *Acidum Nitricum* (кислота азотная)  $\odot = D6 - 0,04$  мкл, а в качестве вспомогательного вещества – натрия хлорид изотонический 0,9% раствор – до 100 мл.

3. По внешнему виду Лацилин представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Срок годности Лацилина при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Лацилин запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лацилин выпускают расфасованным по 20 и 100 мл во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы по 20 мл упаковывают в индивидуальные картонные коробки. Каждая единица фасовки снабжается инструкцией по применению.

5. Лацилин хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Лацилин следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Лацилин относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам.

10. Препарат обладает противовоспалительным действием, усиливает сократительную активность и повышает тонус миометрия, улучшает кровоснабжение органов малого таза, стимулирует тканевой иммунитет и активизирует процессы регенерации слизистой матки.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Лацилин назначают для лечения послеродовых осложнений, включая эндометрит и субинволюцию матки начиная с 8-10 дня после отела.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Лацилин применяют коровам, внутримышечно один раз в сутки в дозе 5 мл на животное:

- при субинволюции матки – 3-4 -кратно с интервалом 24 часа;
- в комплексной терапии острого и хронического катарального эндометрита – 4-кратно с интервалом 2 – 3 дня;
- в комплексной терапии острого гнойно-катарального эндометрита – 5 – 7 раз с интервалом 24 часа.

14. Симптомы передозировки при применении Лацилина в соответствии с инструкцией не выявлены.

15. Особенности действия при первом приеме препарата и при его отмене не выявлено.

16. Лекарственный препарат не предназначен для применения животным в период беременности и лактации.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы ее необходимо ввести как можно скорее, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

18. При применении Лацилина в соответствии с инструкцией побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение Лацилина не исключает использование лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

20. Продукцию животного происхождения в период лечения и после курса применения Лацилина разрешается использовать без ограничений.

## IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Лацилином следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании

работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Лацилином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Лацилина, утвержденная Россельхознадзором 23 октября 2015 года.

|   |  |
|---|--|
| Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. | ООО «РЕПРОВЕТ», 140563, Московская обл., г. Озеры, ул. Ленина, д. 252. |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. | ООО «РЕПРОВЕТ», 140563, Московская обл., г. Озеры, ул. Ленина, д. 252. |
|--|--|

Номер регистрационного удостоверения 32-3-815-2842 НПВР-3-3 9/02401