

ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Порцилис Глессер
против гемофилезного полисерозита свиней инактивированной.

(Организация-разработчик: компания «Интервет Интернешнл Б.В.»,
Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды/
Intervet International B.V., Wim de Körperstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer,
The Netherlands).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Порцилис Глессер (Porcilis® Glässer).
Международное непатентованное наименование: вакцина против гемофилезного полисерозита свиней инактивированная.
2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
Вакцина изготовлена из культуры клеток Haemophilus parasuis (V серотип, штамм 4800), инактивированной формальдегидом, с добавлением адьюванта (α -токоферол ацетата), эмульгатора (полисорбат 80), пеногасителя (симетикон), натрия хлорида, буферных компонентов и воды для инъекций.
3. По внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную жидкость белого цвета. При хранении вакцины допускается выпадение осадка, который легко ресуспендируется при взбалтывании.
Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. После вскрытия вакцина должна быть использована в течение 3 часов. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.
4. Вакцина расфасована по 50 мл (25 доз) в стеклянные или пластиковые флаконы, соответствующей вместимости, герметично укупоренные под вакуумом резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки, обеспечивающие их целостность. В каждую коробку вложена инструкция по применению вакцины.
5. Вакцину хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя при температуре от 2 до 8°C.
6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, подвергшиеся замораживанию, а также вакцина, не использованная в течение 3

часов после вскрытия бракуют, обеззараживают кипячением в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Порцилис Глессер отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Биологические свойства

9. Порцилис Глессер – ветеринарный иммунобиологический препарат (вакцина).

10. Вакцина Порцилис Глессер вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю гемофилезного полисерозита через 14 суток после двукратного введения вакцины, который сохраняется в течение периода откорма (до 200 дней).

Вакцина безвредна и лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для профилактики гемофилезного полисерозита у поросят.

12. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. В благополучных по гемофилезному полисерозиту хозяйствах вакцинации подлежат поросята с 5-недельного возраста. Вакцину вводят внутримышечно двукратно с интервалом 2 недели.

При угрозе инфицирования поросят, полученных от не иммунизированных свиноматок, вакцинируют, начиная с 2-х недельного возраста двукратно, с интервалом 2 недели.

В неблагополучных хозяйствах вакцинируют супоросных свиноматок двукратно за 6-8 недель и 2-4 недели перед опоросом и поросят с 5-недельного возраста двукратно, с интервалом 2 недели.

Ревакцинацию свиноматок проводят однократно за 2-4 недели перед следующим опоросом.

Перед применением вакцину доводят до комнатной температуры 18-25°C и взбалтывают. Место введения вакцины обрабатывают 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

Вакцину вводят животным внутримышечно за ухом в объеме 2,0 мл.

14. Симптомы проявления гемофилезного полисерозита или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлены.

15. Особенности поствакцинальной реакции при первичном и последующем введениях вакцины не выявлено.

16. Порцилис Глессер разрешено применять в период супоросности.

17. Следует избегать нарушений схемы и сроков введения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики гемофилезного полисерозита. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

18. Побочные явления и осложнения при применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не отмечаются. В некоторых

случаях после введения вакцины у животных может наблюдаться повышение температура тела, снижение активности и аппетита и/или формирование припухлости в месте инъекции, проходящие в течение 3 и 14 суток соответственно. В очень редких случаях у поросят возможно проявление анафилактической реакции.

19. Запрещается использовать вакцину Порцилис Глэссер совместно с другими иммунобиологическими препаратами, а также вакцинировать животных другими вакцинами в течение 14 суток до и после очередной иммунизации.

20. Мясо и продукты убоя, полученные от вакцинированных свиней, используют без ограничений независимо от срока вакцинации.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды. При случайном введении препарата человеку, необходимо обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

«Интервет Интернешнл Б.В.» (Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 5831 AN Боксмеер, Нидерланды) / Intervet International B.V. (Wim de Körperstraat 35, P.O. Box 5831 AN Boxmeer, The Netherlands).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «Интервет» (Россия, 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ул. Промышленная, дом 81/1).

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Порцилис Глэссер против гемофильного полисерозита, утвержденная Россельхознадзором 10.05.2011г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»
Номер регистрационного удостоверения 528-1-10.16-3358 № ПВИ-1-4.0/03443