

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

07.10.2019

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Мазь цинковая 10 %

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс»,
610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.)

Номер регистрационного удостоверения:

24-3-9.17-3827 NTPP-3-1.9/00161

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь цинковая 10 %
(Unguentum Zinci 10 %).

Группировочное наименование: цинка оксид.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь цинковая 10 % в 100 г в качестве действующего вещества содержит цинка оксид - 10 г, в качестве вспомогательного вещества вазелин - 90 г.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой густую однородную массу от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности Мази цинковой 10 % в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства.

Запрещается применять Мазь цинковую 10 % после окончания срока годности.

4. Выпускают Мазь цинковую 10 % расфасованной по 55, 160 г в полимерные тубы, закрытые защитными мембранами и колпачками; или по 70, 100, 200, 800 г в полимерные банки соответствующей вместимости, которые закрывают крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую единицу фасовки сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

6. Мазь цинковую 10 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мазь цинковая 10 % относится к фармакотерапевтической группе дерматотропных средств.

10. Действующее вещество препарата цинка оксид оказывает вяжущее, подсушивающее, адсорбирующее и антисептическое действие, уменьшает явления экссудации, воспаления и раздражения. При нанесении на пораженную поверхность денатурирует белки и образует альбуминаты, создавая защитный барьер для раздражающих факторов.

Действующее вещество препарата при местном применении практически не абсорбируется в системный кровоток.

По степени воздействия на организм Мазь цинковая 10 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, алергизирующего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

11. Мазь цинковую 10 % применяют животным для лечения заболеваний кожи (дерматитов, поверхностных ран, ожогов, язв, пролежней, фурункулезов, пиодермии).

12. Противопоказанием к применению Мази цинковой 10 % является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При применении Мази цинковой 10 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью цинковой 10 %. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Специальные исследования на беременных и кормящих самках не проводились. Возможность применения препарата этим группам животных определяет лечащий врач на основании оценки соотношения пользы к возможному риску его применения.

15. Мазь цинковую 10 % применяют животным наружно, нанося тонким слоем на поврежденную поверхность кожи или намазывают на стерильную марлевую салфетку и прикладывают к ране 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней (при необходимости используют повязку). Для предотвращения слизывания мелким животным надевают шейный воротник.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мази цинковой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его применение прекращают, мазь удаляют марлевым тампоном с поверхности кожи, и при необходимости назначают антигистаминные препараты.

17. Симптомы передозировки лекарственного препарата у животных не выявлены.

18. Мазь цинковую 10 % не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок, препарат следует нанести как можно быстрее, далее интервал между обработками не меняется.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Мази цинковой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази цинковой 10 %, утвержденная Россельхознадзором 8 августа 2017 года.