

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Веракола® собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе сопровождающихся диареей

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн»; 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Веракол® (Verakol®).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Веракол® содержит минеральный компонент и матричные настойки растительного происхождения (в 1000 мл): Acidum arsenicosum Ø=D2 – 0,5 нл, Citrullus colocynthis Ø=D1 – 5 нл, Podophyllum peltatum Ø – 1,5 нл, Veratrum album Ø=D1 – 5 нл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат, натрия хлорид, натрия ацетата тригидрат, кислоту соляную, спирт этиловый 95%, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 21 день. Веракол® запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Веракол® расфасованным по 10 мл и 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и алюминиевыми закатываемыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Веракол® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.

6. Веракол® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Веракол® относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам.

10. Веракол® обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

По степени воздействия на организм Веракол® относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. Порядок применения

11. Веракол® назначают собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе сопровождающихся диареей (гастрит, гастроэнтерит, диспепсия, пищевая токсикоинфекция).

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. Веракол® применяют внутримышечно или подкожно 2-3 раза в сутки в течение 5-10 дней в следующих разовых дозах:

- собакам – 0,1 мл/1 кг массы животного;
- кошкам – 0,1 мл/1 кг массы животного (но не менее 0,5 мл/животное);
- крупному рогатому скоту, свиньям – 5,0 мл/животное;
- телятам, пороссятам – 2,5 мл/животное.

14. Симптомы передозировки препарата у животных не установлены.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Противопоказаний и особенностей применения препарата самкам в периоды беременности и лактации не установлено.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

18. При применении Веракола® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Применение Веракола® не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

20. Продукция животного происхождения во время и после применения Веракола® может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Вераколом® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.
23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Веракола® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АлексАнн»
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АлексАнн»
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Номер регистрационного удостоверения 32-3-7.15-2788 № ПВР-3-7.6/01889

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Веракола, утвержденная Россельхознадзором 31 августа 2012 г.