

Рассмотрено и одобрено  
Ветбиофармсоветом  
Протокол № 69  
от 31 октября 2013 г

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по применению родентицидного средства «Бромодил»**

#### **1. Общие сведения**

1.1 Бромодил (Bromodilum).

1.2 Готовая к применению приманка на основе зерна, содержащая в качестве активное действующее вещество производное оксикумарина - бромодиолон 50 мг/кг. По внешнему виду представляет собой цельное зерно или смесь цельного и дробленого зерна красного цвета.

1.3 Средство выпускают по 0,1; 0,5 и 1,0 кг в полимерных пакетах или непрозрачной полимерной таре.

1.4 Хранят с предосторожностью, в сухом месте при температуре до плюс 30°C, в местах, недоступных для посторонних лиц, под замком. Срок годности средства - 1 год от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

#### **2. Фармакологические свойства**

2.1 Бромодиолон относится к ядам-антикоагулянтам, способным накапливаться в печени и нарушать синтез протромбина, что приводит к снижению свертываемости крови.

После поедания приманки, бромодиолон повреждает стенки кровеносных сосудов и вызывает гибель грызунов.

2.2 Производные оксикумарина по степени воздействия на организм человека относятся к 1-му классу опасности (вещества чрезвычайно опасные).

#### **3. Порядок применения препарата**

3.1 Средство применяют для борьбы с крысами и мышами в животноводческих помещениях и других объектах ветеринарного надзора.

3.2 Приманку массой 100 г для крыс и 25 г для мышей с помощью ложки раскладывают вблизи нор и лазов грызунов, но в местах недоступных для детей и животных. На каждые 100 м<sup>2</sup>, в зависимости от заселенности объекта грызунами, определяют от 1 до 5 приманочных точек. По мере поедания приманок их добавляют до полного прекращения поедаемости.

#### **4. Меры личной профилактики**

4.1 К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не страдающие заболеваниями крови и печени, прошедшие специальный инструктаж. Все работы со средством проводят в спецодежде (халат или комбинезон из пылезащитной ткани, головной убор), резиновых перчатках, респираторах. Следует избегать попадания средства в глаза и рот. Во время работы со средством запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы

лицо и руки моют теплой водой с мылом, рот прополаскивают водой. Беременным и кормящим женщинам работать со средством категорически запрещено.

Трупы грызунов собирают щипцами, совком и сжигают или закапывают в землю на глубину не менее 0,5 м, предварительно обработав яму 10% взвесью хлорной извести.

## 5. Порядок предъявления рекламаций

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

## 6. Полное наименование производителя

6.1. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», 213410, г. Горки, ул. Мира 67, ком.5.

Инструкция по применению препарата разработана заведующим отделом токсикологии и незаразных болезней животных РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» Кучинским М.П. и ветеринарным врачом ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен» Недеревой О.Н..

